

# INICIO DE LA CONVERSACIÓN

Solo usted y su proveedor de atención médica saben qué tratamiento es el adecuado para usted. Estas son algunas preguntas que puede utilizar para iniciar una conversación con su proveedor de atención médica sobre sus opciones de tratamiento.

- ¿Cómo se ajustará el tratamiento a mi rutina?
- ¿Qué efectos secundarios podría experimentar?
- ¿Puedo seguir tomando otros medicamentos junto con mi medicamento para el VIH-1?
- ¿Tengo que comer al momento de tomar mi medicamento para el VIH-1?
- ¿Existen otros riesgos para la salud que puedan ser causados por mi tratamiento para el VIH o el VIH-1?



## SU SALUD Y EL VIH-1

### Cómo mantenerse indetectable

Cuando toma PIFELTRO como parte de un régimen de varios comprimidos, este puede ayudarle a conseguir que su carga viral sea indetectable. "Indetectable" significa que el nivel de VIH-1 en la sangre es tan bajo que las pruebas de laboratorio no pueden detectarlo. Cuando el VIH-1 está bajo control, puede enfocarse en su salud y sus objetivos de vida más allá del virus.

## ¿Qué es PIFELTRO?

PIFELTRO es un medicamento recetado para el VIH que se usa con otros medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) en adultos:

- que no han recibido medicamentos para el VIH-1 en el pasado,
- o para reemplazar los medicamentos actuales para el VIH-1 en personas que cumplen con ciertos requisitos de acuerdo con el criterio de su proveedor de atención médica.

El VIH-1 es el virus que causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Lea la [Información sobre PIFELTRO para Pacientes \(Patient Information\)](#) que se adjunta y hable con su proveedor de atención médica sobre esto. También está disponible la [Información de Prescripción \(Prescribing Information\)](#) del médico.

## Información de Seguridad Importante

No tome PIFELTRO si actualmente está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- carbamazepina
- oxcabazepina
- fenobarbital
- fenitoína
- enzalutamida
- rifampina
- rifapentina
- mitotano
- hierba de San Juan

Si no está seguro de si su medicamento está incluido en la lista anterior, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Si en las últimas 4 semanas tomó alguno de estos medicamentos, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico antes de comenzar con PIFELTRO.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

# Información de Seguridad Importante (continuación)

**PIFELTRO puede ocasionar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:** Se han producido **reacciones cutáneas graves** en personas tratadas con PIFELTRO. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si le sale una erupción durante el tratamiento con PIFELTRO. **Deje de tomar PIFELTRO y busque ayuda médica de inmediato si le sale una erupción dolorosa con alguno de los siguientes síntomas:** fiebre, ampollas o llagas en la boca, ampollas o descamación de la piel, o enrojecimiento o hinchazón de los ojos (conjuntivitis).

Pueden producirse **cambios en su sistema inmunitario (Síndrome de Reconstitución Inmunitaria)** cuando comience a tomar medicamentos para el VIH-1. Es posible que su sistema inmunitario se fortalezca y comience a combatir las infecciones que han estado ocultas en su cuerpo durante un largo tiempo. Informe al proveedor de atención médica de inmediato si comienza a tener síntomas nuevos después de comenzar a tomar el medicamento para el VIH-1.

Los efectos secundarios más frecuentes de PIFELTRO incluyen náuseas, mareos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, dolor de estómago (dolor abdominal) y sueños anormales.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIFELTRO. Para obtener más información, consulte al proveedor de atención médica o al farmacéutico.

Antes de comenzar a tomar PIFELTRO, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si PIFELTRO puede hacerle daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si está amamantando o tiene pensado amamantar. PIFELTRO puede pasar a su bebé a través de la leche materna. El VIH puede transmitirse a su bebé a través de la leche materna si su bebé no tiene VIH.

**Informe al proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma,** incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. **Algunos medicamentos interactúan con PIFELTRO.** Haga una lista de los medicamentos y muéstresela al proveedor de atención médica y farmacéutico. Informe al proveedor de atención médica si tomó rifabutina en las últimas 4 semanas. **No comience a tomar un medicamento nuevo sin antes informárselo a su proveedor de atención médica.** El proveedor de atención médica puede indicarle si es seguro tomar PIFELTRO con esos otros medicamentos.

Tome PIFELTRO todos los días exactamente como se lo indique el proveedor de atención médica. Tome PIFELTRO 1 vez al día, aproximadamente a la misma hora cada día.

Informe al proveedor de atención médica si tomó rifabutina en las últimas 4 semanas.

Si toma el medicamento rifabutina durante el tratamiento con PIFELTRO, tome PIFELTRO 2 veces al día, aproximadamente con 12 horas de diferencia, según lo recetado por el proveedor de atención médica. Es posible que no tenga suficiente doravirina en la sangre si toma rifabutina durante el tratamiento con PIFELTRO.

No cambie la dosis ni deje de tomar PIFELTRO sin antes consultar al proveedor de atención médica. Permanezca bajo el cuidado de un proveedor de atención médica cuando tome PIFELTRO.

Tome PIFELTRO según el régimen de dosificación habitual que le indicó el proveedor de atención médica. No omita dosis.

Si olvida tomar una dosis de PIFELTRO, tómela tan pronto como se dé cuenta. Si es casi la hora de su próxima dosis, sátese la dosis omitida y tome la siguiente dosis a la hora programada. No tome 2 dosis de PIFELTRO al mismo tiempo.

Visite a su proveedor de atención médica o farmacia para resurtir la receta de PIFELTRO antes de que se acabe.

Cuando su suministro de PIFELTRO empiece a acabarse, consiga más de este medicamento por medio de su proveedor de atención médica o en la farmacia. Esto es muy importante porque la cantidad de virus en su sangre podría aumentar si la administración del medicamento se interrumpe incluso por un período corto de tiempo. El virus puede desarrollar resistencia a PIFELTRO y volverse más difícil de tratar.

Lea la [Información sobre PIFELTRO para Pacientes \(Patient Information\)](#) que se adjunta y hable con su proveedor de atención médica sobre esto. También está disponible la [Información de Prescripción \(Prescribing Information\)](#) del médico.



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA y sus afiliados.  
Todos los derechos reservados. US-DOV-01493 04/25 [www.pifeltro.com](http://www.pifeltro.com)

  
**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg